

**Correction de l'évaluation de mathématiques n°16 du mardi 18 mai 2021**

**Exercice 1**

**Question 1 :** On peut affirmer que les droites  $(IJ)$  et  $(BE)$  sont parallèles car la droite  $(IJ)$  passe par les deux milieux des segments  $[AB]$  et  $[AE]$ . En effet, d'après le théorème des milieux, la droite qui passe par les deux milieux de deux côtés d'un triangle, est parallèle au troisième côté. Ce qui est le cas ici.

**Question 2 :** Pour montrer que le triangle  $ABE$  est rectangle, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore :

$$\begin{array}{ll} \text{On a d'une part } BE^2 = 10^2 & \text{et d'autre part } AB^2 + AE^2 = 6^2 + 8^2 \\ = 100 & = 36 + 64 \\ & = 100 \end{array}$$

On remarque que  $BE^2 = AB^2 + AE^2$ , alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $ABE$  est rectangle.

**Question 3 :** Comme le triangle  $ABE$  est rectangle, on peut utiliser les formules de trigonométrie :

$$\begin{aligned} \cos(\widehat{AEB}) &= \frac{AE}{BE} \\ \widehat{AEB} &= \arccos\left(\frac{AE}{BE}\right) \\ &= \arccos\left(\frac{8}{10}\right) \\ &\simeq 37 \end{aligned}$$

L'angle  $\widehat{AEB}$  mesure  $37^\circ$ .

**Exercice 2** (4,5 points)

**Question :** Les questions munies des bonnes réponses sont les suivantes :

- |     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1-B | 2-C | 3-B |
| 4-C | 5-A | 6-C |
| 7-A | 8-B | 9-B |

<b>Exercice 3</b>
-------------------

**Question 1 :** La courbe de la figure 1 représente une droite qui ne passe pas par l'origine. Il ne s'agit donc pas d'une situation de proportionnalité.

**Question 2 :** Résolvons l'équation  $A(x) = 750$  :

$$\begin{aligned} A(x) &= 750 \\ -50x + 1250 &= 750 \\ -50x &= 750 - 1250 \\ -50x &= -500 \\ x &= \frac{-500}{-50} \\ x &= 10 \end{aligned}$$

On obtient le résultat  $x = 10$ . Ce qui signifie que 750 personnes se sont abonnées à une revue coûtant 10€.

**Question 3 :** Calculer l'image de 4 par la fonction  $R$  revient à calculer  $R(4)$  :

$$\begin{aligned} R(x) &= -50x^2 + 1250x \\ R(4) &= -50 \times 4^2 + 1250 \times 4 \\ &= -50 \times 16 + 5000 \\ &= 4200 \end{aligned}$$

L'image de 4 par  $R$  est 4200. Cela signifie qu'une revue vendue à 4€ l'unité apporte une recette de 4200€.

**Question 4 :** Déterminer graphiquement pour quel prix de la revue la recette de l'éditeur est maximale revient à chercher l'abscisse du point de la courbe dont l'ordonnée est maximale. Graphiquement, cela donne  $x = 13$ . Le prix de la revue pour que la recette soit maximale est de 13 €.

**Question 5 :** Déterminer graphiquement les antécédents de 6 800 par  $R$  revient à trouver les abscisses des points de la courbe dont l'ordonnée est 6800. On obtient les valeurs 8 et 17. Cela signifie qu'il est possible d'avoir deux tarifs différents qui permettent d'avoir la même recette.

**Question 6 :** Lorsque la revue coûte 5 euros, le nombre d'abonnés est de 1000 et la recette est de 5000€. Ces résultats s'obtiennent graphiquement en lisant l'ordonnées des points des courbes dont l'abscisse est 5.

Par le calcul, cela donne :

$$\begin{array}{ll} A(x) = -50x + 1250 & R(x) = -50x^2 + 1250x \\ A(5) = -50 \times 5 + 1250 & R(5) = -50 \times 5^2 + 1250 \times 5 \\ = -250 + 1250 & = -50 \times 25 + 6250 \\ = 1000 & = 5000 \end{array}$$

<b>Exercice 4</b>
-------------------

**Question 1 :** Pour savoir si le joueur va déclencher la sonnerie, il faut calculer la distance  $MP$ . Pour cela, on utilise le fait que le mur soit perpendiculaire au sol : cela donne un triangle rectangle. Nous pouvons donc utiliser la trigonométrie :

$$\begin{aligned}\tan(\widehat{P}) &= \frac{MC}{MP} \\ MP &= \frac{MC}{\tan(\widehat{P})} \\ &= \frac{1,73}{\tan(36,1)} \\ &\simeq 2,372\end{aligned}$$

Comme  $MP > 2,37$ , alors la sonnerie ne va pas se déclencher.

**Question 2 :** Le nombre moyen de points obtenus par Rémi se note  $m_R$  et se calcule par  $m_R = \frac{40 + 35 + \dots}{7}$ , ce qui donne  $m_R = \frac{357}{7}$  soit  $m_R = 51$ .

**Question 3 :** Posons  $x$  ce nombre de points. Il doit alors satisfaire l'équation  $\frac{12 + 62 + \dots + x + 30}{7} = 51$  :

$$\begin{aligned}\frac{12 + 62 + \dots + x + 30}{7} &= 51 \\ \frac{292 + x}{7} &= 51 \\ 292 + x &= 7 \times 51 \\ x &= 357 - 292 \\ x &= 65\end{aligned}$$

Le nombre de points obtenus par Nadia à la partie 6 est de 65 points.

**Question 4 :** Pour déterminer les nombres médians, il faut d'abord ranger les résultats dans l'ordre :  
 Les résultats rangés de Rémi donnent : 28 - 28 - 35 - 40 - 67 - 74 - 85.  
 Les résultats rangés de Nadia donnent : 7 - 12 - 30 - 62 - 65 - 81 - 100.  
 On en conclue que le nombre médian de points pour Rémi est 40 et celui de Nadia est 62.

**Exercice 5**

**Question 1 :** La vitesse moyenne enregistrée de Madame Surget étant de 107 km/h, la portion de vitesse à enlever est donc  $\frac{5}{100} \times 107 = 5,35$ . La vitesse retenue est donc de  $107 - 5,35 = 101,65$  km/h.

Si pendant 2 minutes, Monsieur Lagarde parcourt 3,2 km, alors en 1h, il va parcourir  $\frac{3,2 \times 60}{2}$ , ce qui donne 96 km/h.

La vitesse retenue se calcule donc par  $96 - 5 = 91$  km/h.

**Question 2 :** La durée écoulée entre 13 h 46 min 54 s et à 13 h 48 min 41 s est de 1 minute et 47 secondes.

La distance de 3,2 km a donc été parcouru en  $60 + 47 = 107$  secondes. En 1h, on aura donc  $\frac{3,2 \times 3600}{107}$  soit une vitesse d'environ 108 km/h. Cette vitesse étant supérieure à 100 km/h, on la diminue de 5%, ce qui donne  $108 - \frac{5}{100} \times 108 \simeq 103$  km/h. La vitesse est nettement supérieure à 90 km/h, Monsieur Durand aura une contravention.

**Exercice 6** (6 points)

**Question 1-2-3 :** Les calculs pour chaque écriture donnent :

$$\begin{aligned} A &= \frac{2 - \frac{11}{14}}{\frac{4}{7} - 2} \\ &= \frac{\frac{28}{14} - \frac{11}{14}}{\frac{4}{7} - \frac{14}{7}} \\ &= \frac{\frac{17}{14}}{-10} \\ &= \frac{17}{14} \times \frac{7}{-10} \\ &= \frac{17}{2} \times \frac{1}{-10} \\ &= -0,85 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{2,5 \times (10^3)^4 \times 10^{-8}}{50 \times 10^{-2}} \\ &= \frac{2,5 \times 10^{12} \times 10^{-8}}{5 \times 10^{-1}} \\ &= \frac{2,5 \times 10^{12-8+1}}{5} \\ &= \frac{1}{2} \times 10^5 \\ &= 5 \times 10^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \left( \frac{2}{54} \div \frac{8}{15} \right) \times \left( \frac{4}{7} \div \frac{5}{21} \right) \\ &= \left( \frac{2}{54} \times \frac{15}{8} \right) \times \left( \frac{4}{7} \times \frac{21}{5} \right) \\ &= \frac{2 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 3 \times 7}{6 \times 3^2 \times 2 \times 4 \times 7 \times 5} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

<b>Exercice 7</b>
-------------------

**Question 1 :** Si on tape le nombre 6 dans la cellule A17, la valeur affichée sera donnée selon le calcul suivant :

$$\begin{aligned}
 B17 &= 2 \times 6^2 - 3 \times 6 - 9 \\
 &= 2 \times 36 - 18 - 9 \\
 &= 72 - 27 \\
 &= 45
 \end{aligned}$$

La cellule B17 affichera 45.

**Question 2 :** D'après le tableur, la valeur 0 est atteinte pour  $x = -1,5$  et 3. Les solutions de l'équation sont donc  $\{-1,5 ; 3\}$ .

**Question 3 :** L'aire  $\mathcal{A}$  du rectangle se calcule par  $\mathcal{A} = Ll$  :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= Ll \\
 &= AB \times AD \\
 &= (2x + 3)(x - 3) \\
 &= 2x^2 - 6x + 3x - 9 \\
 &= 2x^2 - 3x - 9
 \end{aligned}$$

On arrive bien à  $\mathcal{A} = 2x^2 - 3x - 9$ .

**Question 4 :** Comme  $\mathcal{A} = 2x^2 - 3x - 9$ , les valeurs de la colonne B du tableau donnent les valeurs de l'aire du rectangle. Les cellules qui donnent une aire égale à  $5\text{cm}^2$  sont les cellules qui donnent  $x = 3,5$  et  $x = -2$ . On retiendra alors la valeur positive, c'est à dire  $x = 3,5$ .